

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

50
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

15 F

Annexe au Bulletin n° 70

1er JUILLET 1966

AVERTISSEMENTS

POMME DE TERRE

MILDIOU - Les germes du champignon sont devenus abondants dans la plupart des zones productrices. Si nous devons subir une nouvelle période pluvieuse, la maladie pourrait encore s'étendre et anéantir les cultures protégées à des dates mal choisies.

Cependant, il est inutile de traiter les pommes de terre dont le défanage est prévu avant le 14 Juillet.

Par contre, sur toutes les autres cultures, un nouveau traitement doit être réalisé le 6 ou le 7 au plus tard.

TOMATE

MILDIOU - Effectuer une nouvelle application fongicide au début de la semaine du 4 au 10 Juillet.

POMMIER-POIRIER

CARPOCAPSE - Renouveler le traitement dans les meilleurs délais.

TAVELURE - Des taches ont pu apparaître ces jours derniers. Eventuellement, ajouter un fongicide à la bouillie préparée contre le Carpocapse.

INFORMATIONS

POMME DE TERRE

DORYPHORE - En cas de présence de larves, adjoindre un insecticide à la bouillie contre le Mildiou.

P.151

POIREAU

THRIPS - La végétation du poireau peut être très ralentie par ce petit insecte qui, par ses piqûres, provoque l'apparition de zones blanches sur les feuilles. Examiner attentivement les plantes et éventuellement traiter avec un ester phosphorique.

TEIGNE DU POIREAU - Des pontes ont été observées, au cours de ces derniers jours, notamment dans le Nord de la Manche. Là encore il convient de bien examiner les cultures, et, si la présence de jeunes chenilles est constatée, traiter de préférence avec du Parathion.

ECHALOTE

CHAMPIGNONS DIVERS - Un traitement effectué à cette époque, avec l'un des produits utilisés contre le Mildiou de la pomme de terre, limitera la contamination des bulbes par divers champignons auteurs de pourritures en cours de conservation.

OIGNON ET PORTE-GRAINES D'OIGNON

MILDIOU - Dans les zones où cette maladie cause habituellement des dégâts il convient de réaliser un traitement avec un anti-Mildiou classique.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

F. BARBOTIN et G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.